

## **Behandlung Aktinischer Keratosen mit Solacutan® Gel**

Zur Behandlung der vorhandenen aktinischen Keratosen (Praecancerosen, Vorstufen zu sogenanntem „weissem Hautkrebs“) habe ich Ihnen Solacutan® Gel abgegeben.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Das Gel sollte morgens und abends dünn auf die betroffenen Stellen (alle rauen Stellen) mit dem Finger aufgetragen werden.
2. Gesunde Haut zeigt keine Reaktion auf die Behandlung.
3. Die Behandlungsdauer beträgt in der Regel 3 Monate, nach 3 Wochen ist eine erste Verlaufskontrolle zur Beurteilung der Verträglichkeit nötig.
4. Eine erbsengrosse Menge Gel reicht für eine Fläche von 5 x 5 cm.
5. Nach dem Auftragen des Gels dürfen Sie mit einem Abstand von 15 Minuten weitere Produkte, z. Bsp. Sonnencreme, anwenden (die Packungsbeilage sagt etwas anderes).
6. Eine erste Reaktion tritt meist innerhalb der ersten 1-2 Wochen auf und umfasst in der Regel eine leicht verstärkte Rötung und Schuppung der betroffenen Stellen. Sollte diese Reaktion heftiger ausfallen, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden.
7. Auch umgebende Hautstellen können gerötet werden.

Kontaktieren Sie uns bitte bei jeglicher Unsicherheit unverzüglich: 043 497 89 02