

Behandlung der Akne mit Akliel[®] Crème oder Acnatac[®] Gel

Zur Behandlung der Akne habe ich Ihnen Akliel[®] Crème oder Acnatac[®] Gel abgegeben.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Die Crème resp. das Gel sollte abends vor dem Schlafengehen nach der Reinigung des Gesichts dünn auf die betroffenen Regionen (nicht nur auf einzelne „Bibeli“) mit dem Finger aufgetragen werden. Bitte waschen Sie anschliessend die Hände mit Seife.
2. Während den ersten 2-3 Wochen ist mit den meisten Nebenwirkungen zu rechnen: v.a. Rötung, Reizung, Abschuppung, Spannen der Haut. Wenden Sie das Produkt in dieser Zeit nur jeden 2.Tag, am besten an den „geraden Daten“, an, danach täglich.
3. Verwenden Sie Feuchtigkeitscrèmes zur Linderung allfälliger Nebenwirkungen grosszügig. Ca 15-20 Minuten nach Auftragen von Akliel[®] Crème oder Acnatac[®] Gel können Sie Feuchtigkeitscrème verwenden.
4. Beachten Sie, dass Akliel[®] Crème resp. Acnatac[®] Gel zu einer vermehrten Empfindlichkeit der Haut auf die Sonne führen kann und verwenden Sie vermehrt Sonnencrèmes, am besten Schutzfaktor 50.
5. An alle Patientinnen, die schwanger werden könnten: Unter der Behandlung mit Akliel[®] Crème oder Acnatac[®] Gel dürfen Sie nicht schwanger werden, da der Wirkstoff ein Ungeborenes schädigen könnte.

Kontaktieren Sie uns bitte bei jeglicher Unsicherheit, ohne zu zögern: 043 497 89 02